

# Fungo®-FR

## FUNGICIDA

Suspensión acuosa

### DESCRIPCIÓN:

La concentración de polisulfuro de calcio contenida en **Fungo-FR** combinada con los lipopéptidos antimicrobianos es de acción tóxica al causar una disminución en la asimilación de oxígeno, los sustratos son agotados lentamente y la energía (ATP) requerida para el metabolismo de los hongos fitopatógenos no se forma en cantidades suficientes, afectando la viabilidad de las esporas e inhibiendo el desarrollo de su micelio.

El silicio es capaz de incrementar la resistencia mecánica del tejido vegetal y el ácido salicílico activa el mecanismo de defensa de la planta ayudándola a sintetizar fitoalexinas, a la construcción de barreras estructurales y a la respuesta hipersensible.

### BENEFICIOS:

- ✓ Previene y controla enfermedades como tizones, mohos y cenizas.
- ✓ Incrementa la resistencia del cultivo.
- ✓ No genera resistencia en los hongos.
- ✓ Compatible con programas orgánicos y convencionales.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Polisulfuro de calcio	20.0 %
Silicio	1.0%
Ácido salicílico	1.0%
Lipopéptidos antimicrobianos	1000 ppm

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **Fungo-FR** con productos de fuerte reacción alcalina; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

No aplicar con altas temperaturas, amenaza de lluvias o fuertes vientos.

### CULTIVOS

Agave, Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Granos, Lechuga, Melón, Ornamentales, Papa, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zarcamora

Aguacate, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Papayo, Peral, Piña

### RECOMENDACIONES

Aplicar de 1 a 2 L/ha a los primeros síntomas de enfermedades en intervalos de 1 semana.

Preventivamente: 1 L/ha en intervalos de 2 a 4 semanas.

Aplicar de 2 a 3 L/ha a los primeros síntomas de enfermedades en intervalos de 1 semana.

Preventivamente: 2 L/ha en intervalos de 2 a 4 semanas.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Agite el envase y destape con cuidado, mida la cantidad indicada de **Fungo-FR** y agréguelo al tanque fertilizador con agitación constantemente para posteriormente inyectarla en el sistema de riego.

Aplicar **Fungo-FR** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje y/o los frutos de la planta.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad”