

POTENCO

REGULADOR DE LA SÍNTESIS DE AZUCARES

Suspensión acuosa

DESCRIPCIÓN:

La mezcla de ácidos orgánicos de **Potenco** forma quelatos estables con los nutrientes, los cuales provienen de la síntesis orgánica realizada por microorganismos específicos que confieren las características de una rápida translocación y asimilación de estos.

Las enzimas hidrolíticas y ácido salicílico estimulan los procesos metabólicos de la planta, permitiendo que los nutrientes fluyan por los tejidos de conducción hacia los puntos demandantes de la planta logrando el desarrollo y generación de nuevo tejido foliar, así como en la inducción de defensa de las plantas.

BIOESTIMULANTES

BENEFICIOS:

- ✓ Mejora la absorción, translocación y asimilación de nutrientes.
- ✓ Favorece la síntesis y transporte de azúcares, aumentando los grados Brix de los frutos.
- ✓ Aumenta la tolerancia del cultivo a condiciones de estrés.
- ✓ Mejora el proceso de la fotosíntesis y respiración de la planta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Potenco** con productos de fuerte reacción alcalina; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

No aplicar con altas temperaturas, amenaza de lluvias o fuertes vientos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácidos fúlvicos	6.0%
Ácidos carboxílicos	4.0%
Ácido salicílico	1.0%
Nitrógeno (N ₂)	1.5%
Fosforo (P ₂ O ₅)	2.0%
Potasio (K ₂ O)	1.0%
Fierro (Fe)	0.40%
Magnesio (Mg)	0.25%
Zinc (Zn)	0.10%
Boro (B)	0.02%
Molibdeno (Mo)	0.1%
Manganeso (Mn)	0.1%
Enzimas hidrolíticas	500 ppm

CULTIVOS

Agave, Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Granos, Lechuga, Melón, Ornamentales, Papa, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zarcamora

Aguacate, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Papayo, Peral, Piña

RECOMENDACIONES

Aplicar 1 L/ha desde la formación del primer fruto, ensanchamiento del bulbo o desarrollo del tubérculo hasta la maduración con intervalos de 15 a 30 días y/o en condiciones de estrés o enfermedad.

Aplicar 2 L/ha desde la formación del primer fruto hasta la maduración con intervalos de 15 a 30 días y/o en condiciones de estrés o enfermedad.

INSTRUCCIONES DE USO: Agite el envase y destape con cuidado, mida la cantidad indicada de **Potenco** y agréguelo al tanque fertilizador con agitación constantemente para posteriormente inyectarla en el sistema de riego.

Aplicar **Potenco** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje y/o los frutos de la planta.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad”